СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ
14 МАР 2018

# ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению поливалентной концентрированной вакцины против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека и дизентерии животных.
(Вакцина против клостридиозов животных).
(Организация-разработчик - ООО «Агровет», 109472 г. Москва, ул. Ташкентская д.34, корп. 5)

Номер регистрационного удостоверения 77-1-19.12-3748 ВТВР-1-2.1/00920

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата - Вакцина против клостридиозов животных.

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата - Поливалентная концентрированная вакцина против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека и дизентерии животных.

2. Лекарственная форма: Суспензия для инъекций.

Вакцина содержит культуры вакцинных штаммов Clostridium septicum, Cl.novyi и Cl. perfringens типов B, C и D, инактивированные формалином с добавлением в качестве адъюванта гидрата окиси алюминия в количестве 35 %-тов по объему.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится культур штаммов: Cl. septicum не менее 8 млрд. микробных клеток; Cl. novyi не менее 10 ЕС; Cl. perfringens тип B, C не менее 30 ЕС; Cl. perfringens типов D не менее 20 ЕС.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию серовато-желтого цвета с

быстро выпадающим осадком, легко суспендирующимся при взбалтывании.

Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования, и не менее двух часов после вскрытия флакона. Вакцина по истечении срока годности к применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 50 $см^3$ (25 доз); 100 $см^3$ (50 доз); 200 $см^3$ (100 доз) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими их целостность.

В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцина во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным внешним видом, подвергавшаяся замораживанию, с истекшим сроком

годности, не использованная в день вскрытия флакона, бракуют и обеззараживают кипячением в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Отпускается без рецепта.

## II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологический лекарственный препарат для ветеринарного применения.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у овец к возбудителям брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец, дизентерии ягнят, через 10-12 дней после двукратного введения, продолжительностью 6 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии ягнят в хозяйствах, угрожаемых и неблагополучных по данным болезням.

12. Запрещено вакцинировать животных клинически больных и/или ослабленных, истощенных, за две недели до и после стрижки и хирургических операций.

13. При работе с вакциной следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор и резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и слизистые оболочки их промывают чистой водой. При случайном введении вакцины человеку необходимо место инъекции обработать любым антисептиком (5%-ным раствором йода или 70%-ным раствором этилового спирта) и обратиться в медицинское учреждение.

В случае розлива вакцины, участок пола или почвы заливают 5 % раствором хлорамина или едкого натрия.

14. Запрещено вакцинировать животных на последнем месяце беременности и в течение 10 суток после окота.

15. Вакцинации подлежат: - ягнята с 3-х месячного возраста;

- суягные матки за 1,5 - 2 месяца до окота;

- овцы за 30 - 45 дней до начала пастбищного сезона и осеннего перегона.

Вакцину вводят внутримышечно двукратно в область внутренней поверхности бедра с интервалом 20-25 дней в объеме:

| Животные | Первично | Вторично |
|---|---|---|
| Взрослые овцы | 2,0 $см^3$ | 2,0 $см^3$ |
| Ягнята до 6-месячного возраста | 0,5 $см^3$ | 1,0 $см^3$ |

Ягнят с 6-месячного возраста вакцинируют согласно схемы вакцинации взрослых животных.

При выявлении в хозяйстве указанных болезней проводят вынужденную внеплановую вакцинацию всего поголовья овец. При этом интервал между инъекциями вакцины может быть сокращен до 12-14 дней.

В неблагополучных хозяйствах овец вакцинируют каждые 3 месяца.

Перед введением вакцину взбалтывают.

Для вакцинации используют шприцы ветеринарные инъекционные или полуавтоматические, стерилизованные кипячением в дистиллированной воде в течение 30 минут.

Место инъекции обрабатывают 70 %-ным раствором этилового спирта.

16. У вакцинированных животных допускается повышение температуры тела на 0,5 °С - 1,0 °С и проявление хромоты при опирании на конечность, в которую вводили вакцину, проходящие через 3-4 дня после введения и не требующее лечения.

17. Передозировка вакцины у животных не вызывает симптомов проявления брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец, дизентерии ягнят и других патологических признаков.

18. Запрещается применение вакцины одновременно с иммунодепрессантами.

19. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии ягнят.

20. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от срока введения вакцины.

| | |
|---|---|
| Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: | Обособленное подразделение ООО «Агровет», 612079 Кировская область, Оричевский район, пгт. Левинцы. |
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: | ООО «Агровет», 109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.34, корп. 5. |

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу «Инструкция по применению поливалентной концентрированной вакцины против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека и дизентерии животных». (Вакцина против клостридиозов животных), утверждённая Россельхознадзором 14.06. 2017 г.